

Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Топологія



Лекція 3

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всіможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всім можливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під упорядкованою парою (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всім можливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під **упорядкованою парою** (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під **упорядкованою парою** (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під **упорядкованою парою** (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: *на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y .* Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$




Під **упорядкованою парою** (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Декартовий (Картезіанський) добуток множин X та Y , позначається $X \times Y$, — це множина всеможливих упорядкованих пар (x, y) , де $x \in X$, $y \in Y$, тобто

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$



Під **упорядкованою парою** (x, y) будемо розуміти одноелементну множину $\{x, \{x, y\}\}$ зі зазначенням, який елемент стоїть на першому місці, тобто впорядковану пару (x, y) можна інтерпретувати наступним чином: на першому місці стоїть елемент x , а на другому — y . Очевидно, що тоді $\{x, y\} \neq (x, y) \neq (y, x)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо *декартовий n-степінь* множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо *впорядковану трійку* трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та *впорядкований набір* з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо *декартовий n-степінь* множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо *впорядковану трійку* трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та *впорядкований набір* з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо *декартовий n-степінь* множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо *впорядковану трійку* трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та *впорядкований набір* з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо *декартовий n-степінь* множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо *впорядковану трійку* трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та *впорядкований набір* з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо *декартовий n-степінь* множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо *впорядковану трійку* трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та *впорядкований набір* з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо *декартовий n-степінь* множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо *впорядковану трійку* трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та *впорядкований набір* з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо **декартовий n -степінь** множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \dots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо **впорядковану трійку** трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та **впорядкований набір** з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо **декартовий n -степінь** множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо **впорядковану трійку** трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та **впорядкований набір** з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо **декартовий n -степінь** множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо *впорядковану трійку* трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та *впорядкований набір* з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо **декартовий n -степінь** множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо **впорядковану трійку** трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та **впорядкований набір** з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо **декартовий n -степінь** множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо **впорядковану трійку** трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та **впорядкований набір** з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо **декартовий n -степінь** множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо **впорядковану трійку** трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та **впорядкований набір** з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

За індукцією вводиться декартовий добуток трьох і довільної скінченної кількості множин:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = (X_1 \times X_2) \times X_3$$

та

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n,$$

для довільного натурального числа $n > 2$.

Надалі, для довільної непорожньої множини X і довільного натурального числа n через X^n позначатимемо **декартовий n -степінь** множини X , тобто:

$$X^1 = X, \quad X^2 = X \times X, \quad \dots, \quad X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-разів}}.$$

За аналогією з декартовим добутком, введемо **впорядковану трійку** трьох елементів $(a_1, a_2, a_3) = ((a_1, a_2), a_3)$ та **впорядкований набір** з n елементів

$$(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n),$$

для довільного натурального числа $n > 3$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Приклад 1.2.29

Доведіть, що $A \times B = \emptyset$ тоді і лише тоді, коли $(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset)$.

Розв'язок. Якщо $A \times B \neq \emptyset$, то існує елемент $(a, b) \in A \times B$. Звідси випливає, що $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$.

Аналогічно, якщо $A \neq \emptyset$ і $B \neq \emptyset$, то існують елементи $a \in A$ та $b \in B$. А отже $(a, b) \in A \times B$ і $A \times B \neq \emptyset$.

Приклад 1.2.30

Доведіть, якщо $A \times B \neq \emptyset$, то $A \times B \subseteq C \times D$ тоді і лише тоді, коли $(A \subseteq C) \wedge (B \subseteq D)$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $(a, b) \in C \times D$. Отож, якщо $a \in A$, то $a \in C$. Аналогічно отримуємо, якщо $b \in B$, то $b \in D$.

(\Leftarrow) Нехай $(a, b) \in A \times B$. Тоді $a \in A$ і $a \in C$. Також, $b \in B$ і $b \in D$. Звідси випливає, що $(a, b) \in C \times D$ і $A \times B \subseteq C \times D$.

Вправа 1.2.9

Доведіть такі рівності:

- (i) $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C;$
- (ii) $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C;$
- (iii) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C).$

Вправа 1.9.10

Доведіть такі рівності:

- (i) $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D);$
- (ii) $(A \times C) \cup (B \times D) = (A \cup B) \times (C \cup D);$
- (iii) $A \times C = (A \times Y) \cap (X \times C);$
- (iv) $(A \times D)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times D^c),$

де $A, B \subseteq Y$ і $C, D \subseteq Y.$

Вправа 1.2.9

Доведіть такі рівності:

- (i) $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C;$
- (ii) $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C;$
- (iii) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C).$

Вправа 1.9.10

Доведіть такі рівності:

- (i) $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D);$
- (ii) $(A \times C) \cup (B \times D) = (A \cup B) \times (C \cup D);$
- (iii) $A \times C = (A \times Y) \cap (X \times C);$
- (iv) $(A \times D)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times D^c),$

де $A, B \subseteq Y$ і $C, D \subseteq Y.$

Вправа 1.2.9

Доведіть такі рівності:

- (i) $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C;$
- (ii) $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C;$
- (iii) $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C).$

Вправа 1.9.10

Доведіть такі рівності:

- (i) $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D);$
- (ii) $(A \times C) \cup (B \times D) = (A \cup B) \times (C \cup D);$
- (iii) $A \times C = (A \times Y) \cap (X \times C);$
- (iv) $(A \times D)^c = (A^c \times Y) \cup (X \times D^c),$

де $A, B \subseteq Y$ і $C, D \subseteq Y.$

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається *частковим відображенням*, і позначається так $f: X \rightarrow Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”.

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається *областю визначення часткового відображення* f , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається *областю значень часткового відображення* f .

Зауважимо, якщо $f: X \rightarrow Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightarrow Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”.

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightarrow Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightarrow Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”.

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightarrow Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightarrow Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”.

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightarrow Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightarrow Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”.

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightarrow Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”.

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що " f частково відображає X в Y ".

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”.

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин.

Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що " f частково відображає X в Y ".

Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин. Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що " f частково відображає X в Y ".
Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин. Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що “ f частково відображає X в Y ”. Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин. Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що " f частково відображає X в Y ".
Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин. Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що " f частково відображає X в Y ".
Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченою, і нескінченою, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин. Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що " f частково відображає X в Y ". Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченною, і нескінченною, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Відношення — це підмножина декартового добутку двох множин. Відношення f , означене на декартовому добутку $X \times Y$ таке, що для кожного елемента x з X існує не більше одного елемента y з Y такого, що $(x, y) \in f$ називається **частковим відображенням**, і позначається так $f: X \rightharpoonup Y$. У цьому випадку кажуть, що " f частково відображає X в Y ". Підмножина

$$\mathbf{D}(f) = \{x \in X \mid \text{існує елемент } y \text{ в } Y \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю визначення часткового відображення f** , а підмножина

$$\mathbf{E}(f) = \{y \in Y \mid \text{існує елемент } x \text{ в } X \text{ такий, що } (x, y) \in f\}$$

називається **областю значень часткового відображення f** .

Зауважимо, якщо $f: X \rightharpoonup Y$ — часткове відображення, то для кожного елемента $x \in X$ множина $\bar{x} = \{y \in Y \mid (x, y) \in f\}$ є не більше ніж одноточковою, хоча множина $\bar{y} = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ може бути і порожньою, і одноточковою, і скінченою, і нескінченою, в залежності від вибору $y \in Y$, тобто від визначення часткового відображення f .

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається *відображенням* з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що *елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$* , і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається *функцією*.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається *відображенням* з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що *елеметові* $x \in X$ *часткове відображення (відображення)* f *ставить у відповідність* елемент $y \in Y$, і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається *функцією*.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$, і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$, і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$, і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що **елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$** , і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що **елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$** , і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що **елементові** $x \in X$ **часткове відображення (відображення)** f **ставить у відповідність** елемент $y \in Y$, і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що **елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$** , і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, область визначення якого збігається з X , тобто $D(f) = X$, називається **відображенням** з множини X в Y і позначається так $f: X \rightarrow Y$.

Якщо визначено часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$ (відображення $f: X \rightarrow Y$) і $(x, y) \in f$, то у цьому випадку будемо говорити, що **елементові $x \in X$ часткове відображення (відображення) f ставить у відповідність елемент $y \in Y$** , і це позначатимемо так: $y = f(x)$. Надалі, якщо для відображення $f: X \rightarrow Y$ зрозуміло, якими є множини X та Y , то для спрощення викладу відображення f позначатимемо так: $y = f(x)$.

Часткове відображення $f: X \rightharpoonup Y$, де Y — множина чисел (натуральних, цілих, раціональних, дійсних, комплексних), називається **функцією**.



Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = |y|\}$ і $\rho_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = |y|\}$ і $\rho_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = |y|\}$ і $\rho_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = |y|\}$ і $\rho_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).



Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = |y|\}$ і $\rho_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_3 = \{(0, 0), (0, 1)\}$ та $\rho_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = 1\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_3 = \{(0, 0), (0, 1)\}$ та $\rho_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = 1\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_3 = \{(0, 0), (0, 1)\}$ та $\rho_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = 1\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_3 = \{(0, 0), (0, 1)\}$ та $\rho_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = 1\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).



Приклад 1.2.31

Відношення $\rho_3 = \{(0, 0), (0, 1)\}$ та $\rho_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = 1\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ не є частковими відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\varphi_1 = \{(x, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ та $\varphi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y, |x| \leq 3\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є частковими відображеннями, але не є відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\varphi_1 = \{(x, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ та $\varphi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y, |x| \leq 3\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є частковими відображеннями, але не є відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\varphi_1 = \{(x, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ та $\varphi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y, |x| \leq 3\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є частковими відображеннями, але не є відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\varphi_1 = \{(x, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ та $\varphi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y, |x| \leq 3\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є частковими відображеннями, але не є відображеннями (див. рис.).



Приклад 1.2.31

Відношення $\varphi_1 = \{(x, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ та $\varphi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y, |x| \leq 3\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є частковими відображеннями, але не є відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\phi_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = y\}$ та $\phi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\psi_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = y\}$ та $\psi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\psi_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = y\}$ та $\psi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є відображеннями (див. рис.).





Приклад 1.2.31

Відношення $\psi_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = y\}$ та $\psi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є відображеннями (див. рис.).



Приклад 1.2.31

Відношення $\psi_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x = y\}$ та $\psi_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid |x| = y\}$ на множині $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ є відображеннями (див. рис.).



Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати *образ* елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — *повний прообраз* елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати *образом* множини A та *повним прообразом* множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається *ін'єктивним*, або *взаємно однозначним*, або *вкладенням*, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, *сюр'єктивним*, або *відображенням "на"*, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається *бієктивним*. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають *ін'єкцією*, *сюр'єкцією* та *бієкцією*, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'ективним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'ективним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'ективні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'екцією** та **біекцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'ективним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'ективним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'ективні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'екцією** та **біекцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'ективним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'ективним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'ективні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'екцією** та **біекцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'ективним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'ективним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'ективні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'екцією** та **біекцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням "на"**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням “на”**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням “на”**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$.

Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **бієкцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'ективним**, або **відображенням “на”**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'ективним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'ективні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'екцією** та **біекцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'ективним**, або **відображенням “на”**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'ективним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'ективні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'екцією** та **біекцією**, відповідно.

Надалі, якщо $f: X \rightarrow Y$ — (часткове) відображення, то для $x \in X$, $A \subseteq D(f)$, $y \in Y$ і $B \subseteq E(f)$, то через $f(x)$ будемо позначати **образ** елемента x стосовно (часткового) відображення f , тобто такий елемент $y \in Y$, що $(x, y) \in f$; через $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in f\}$ — **повний прообраз** елемента y стосовно (часткового) відображення f ; а також позначимо

$$f(A) = \bigcup_{x \in A} \{f(x)\} \quad \text{i} \quad f^{-1}(B) = \bigcup_{y \in B} \{f^{-1}(y)\},$$

які ми будемо називати **образом** множини A та **повним прообразом** множини B стосовно (часткового) відображення f .

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ін'єктивним**, або **взаємно однозначним**, або **вкладенням**, якщо для будь-яких $x, y \in X$ з того, що $x \neq y$ випливає $f(x) \neq f(y)$, **сюр'єктивним**, або **відображенням “на”**, якщо для кожного елемента $y \in Y$ існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$. Відображення, яке одночасно є ін'єктивним і сюр'єктивним називається **бієктивним**. У математичній літературі часто ін'єктивні, сюр'єктивні та бієктивні відображення називають **ін'єкцією**, **сюр'єкцією** та **біекцією**, відповідно.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

$\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є відображенням.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ➊ $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ➋ $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ➌ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ➍ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є біективним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ➊ $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ➋ $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ➌ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ➍ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є біективним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ➊ $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ➋ $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ➌ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ➍ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є біективним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ① $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ② $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ③ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ④ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є бієктивним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ① $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ② $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ③ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ④ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є бієктивним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ① $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ② $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ③ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ④ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є бієктивним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ① $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ② $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ③ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ④ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є бієктивним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ① $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ② $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ③ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ④ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є бієктивним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.32

Через \sin позначимо відношення, яке кожному дійсному числу x ставить у відповідність $\sin x$. Тоді відображення

- ① $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не є ін'єктивним і не є сюр'єктивним;
- ② $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ не є ін'єктивним але є сюр'єктивним;
- ③ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ є ін'єктивним, але не є сюр'єктивним;
- ④ $\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ є бієктивним.

Зауважимо також, що усі вище перелічені відображення є різними.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (1) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$
- (2) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
- (3) $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$
- (4) $f(A^c) = f(X) \setminus f(A)$
- (5) $f(f^{-1}(C)) \subseteq C$
- (6) $f(f^{-1}(C)) = C$ та $f(f^{-1}(D)) = D$ тоді і тільки тоді, коли f є відображенням.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Приклад 1.2.33

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення, $A, B \subseteq X$ і $C, D \subseteq f(X)$. Доведіть такі властивості:

- (i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;
- (ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$;
- (iii) включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$;
- (v) включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю;
- (vi) з $A \subseteq B$ випливає $f(A) \subseteq f(B)$;
- (vii) $f\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (viii) $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в X ;
- (ix) включення $f\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in J} f(A_i)$ не можна замінити рівністю;
- (x) $f^{-1}\left(\bigcup_{i \in J} A_i\right) = \bigcup_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xi) $f^{-1}\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \bigcap_{i \in J} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in J}$ підмножин в Y ;
- (xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

(i) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$. Спочатку доведемо включення $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$. Нехай $y \in f(A \cup B)$, тобто існує такий елемент $x \in A \cup B$, що $f(x) = y$. Маємо $(x \in A) \vee (x \in B)$. Тоді

$$(x \in A \Rightarrow f(x) = y \in f(A)) \vee (x \in B \Rightarrow f(x) = y \in f(B)).$$

Звідси маємо, що

$$y = f(x) \wedge y \in f(A) \cup f(B).$$

Тепер доведемо включення $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. Якщо $y \in f(A) \cup f(B)$, то

$$y \in f(A) \vee y \in f(B).$$

Тоді

$$\begin{aligned} y \in f(A) &\Rightarrow \exists x \in A \text{ такий, що } f(x) = y, \\ y \in f(B) &\Rightarrow \exists x \in B \text{ такий, що } f(x) = y. \end{aligned}$$

Отож,

$$y = f(x) \wedge x \in A \cup B,$$

тобто $y \in f(A \cup B)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(ii) $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$. Нехай $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тоді існує елемент $x \in A$ такий, що $f(x) = y$, але $y \notin \{f(x) \mid x \in B\}$. Отже $x \notin B$ і $x \in A \setminus B$. Звідси випливає, що $y \in f(A \setminus B)$.

(iii) Те, що включення $f(A \setminus B) \subseteq f(A) \setminus f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f(\mathbb{R} \setminus [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) = [-1, 1],$$

але

$$f(\mathbb{R}) \setminus f([0, +\infty)) = [-1, 1] \setminus [-1, 1] = \emptyset.$$

(iv) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Нехай $y \in f(A \cap B)$. Тоді існує елемент $x \in A \cap B$ такий, що $f(x) = y$. Але $x \in A$ та $x \in B$, а отже

$$y = f(x) \in f(A) \quad \text{i} \quad y = f(x) \in f(B).$$

Отож,

$$y \in f(A) \cap f(B),$$

звідки випливає включення

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \quad \Rightarrow \quad f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

(v) Те, що включення $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ не можна замінити рівністю ілюструє такий приклад. Розглянемо відображення $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, означене за формулою

$$f(x) = \sin x.$$

Тоді

$$f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) = f(\{0\}) = \{0\},$$

однак

$$f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) = [-1, 1] \cap [-1, 1] = [-1, 1].$$

(vi) $A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$. Припустимо, що $A \subseteq B$. Тоді існує елемент $x \in X$ такий, що $f(x) = y$ і $x \in A$. Отже, $x \in B$ і $f(x) = y \in f(B)$. Звідси випливає імплікація

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B).$$

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(vii) $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x \in A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i), \end{aligned}$$

звідки випливає рівність $f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$.

(viii) $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i)$. Справді,

$$\begin{aligned} y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i\right) &\iff \exists x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i : f(x) = y \iff \\ &\iff \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : x \in A_i : f(x) = y \implies \\ &\implies \exists x : \forall i \in \mathcal{J} : y \in f(A_i) \iff \\ &\iff y \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f(A_i). \end{aligned}$$

(ix) Приклад будується аналогічно, як і у випадку (vi).

(x) $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(x) $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(x) $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(x) $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(x) $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \exists i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї $\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

(xi) $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$. Справді, оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) &\iff f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : f(x) \in A_i \iff \\ &\iff \forall i \in \mathcal{J} : x \in f^{-1}(A_i) \iff \\ &\iff x \in \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i), \end{aligned}$$

то виконується рівність $f^{-1} \left(\bigcap_{i \in \mathcal{J}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathcal{J}} f^{-1}(A_i)$ для довільної сім'ї

$\{A_i\}_{i \in \mathcal{J}}$ підмножин в Y .

(xii) $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$. Оскільки

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \setminus D) &\iff f(x) \in C \setminus D \iff \\ &\iff f(x) \in C \wedge f(x) \notin D \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \wedge x \notin f^{-1}(D) \iff \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D), \end{aligned}$$

то маємо, що $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Вправа 1.2.11

Наведіть приклад відображення, для якого не виконується обернена імплікація до твердження (vi)

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$$

з прикладу 1.2.33.

Вправа 1.2.12

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що виконуються такі умови:

- (i) $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ для довільної підмножини $A \subseteq X$;
- (ii) $B \cap f(A) = f(f^{-1}(B) \cap A)$ для довільних підмножин $A \subseteq X$ і $B \subseteq Y$, зокрема $B \cap f(X) = f(f^{-1}(B))$.

Вправа 1.2.11

Наведіть приклад відображення, для якого не виконується обернена імплікація до твердження (vi)

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$$

з прикладу 1.2.33.

Вправа 1.2.12

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що виконуються такі умови:

- (i) $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ для довільної підмножини $A \subseteq X$;
- (ii) $B \cap f(A) = f(f^{-1}(B) \cap A)$ для довільних підмножин $A \subseteq X$ і $B \subseteq Y$, зокрема $B \cap f(X) = f(f^{-1}(B))$.

Вправа 1.2.11

Наведіть приклад відображення, для якого не виконується обернена імплікація до твердження (vi)

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$$

з прикладу 1.2.33.

Вправа 1.2.12

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що виконуються такі умови:

- (i) $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ для довільної підмножини $A \subseteq X$;
- (ii) $B \cap f(A) = f(f^{-1}(B) \cap A)$ для довільних підмножин $A \subseteq X$ і $B \subseteq Y$, зокрема $B \cap f(X) = f(f^{-1}(B))$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противіччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противірччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противіччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противіччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противірччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противірччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противірччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противірччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого противірччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Приклад 1.2.34

Доведіть, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним тоді і лише тоді, коли

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

для довільних підмножин $A, B \subseteq X$.

Розв'язок. (\Rightarrow) Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ є взаємно однозначним і нехай $A, B \subseteq X$ — довільні підмножини. Оскільки для довільного $y \in f(A \cap B)$ існує єдиний елемент $x \in A \cap B \subseteq X$ такий, що $f(x) = y$, то

$$\begin{aligned}y \in f(A \cap B) &\iff \exists x : x \in A \cap B, f(x) = y \iff \\&\iff x \in A \wedge x \in B \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \wedge y \in f(B) \wedge f(x) = y \iff \\&\iff y \in f(A) \cap f(B).\end{aligned}$$

(\Leftarrow) Тепер припустимо, що для довільних підмножин $A, B \subseteq X$ виконується рівність

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Припустимо протилежне: відображення $f: X \rightarrow Y$ не є взаємно однозначним. Тоді існують різні $x_1, x_2 \in X$ такі, що

$$f(x_1) = f(x_2) = y.$$

Нехай $A = \{x_1\}$ і $B = \{x_2\}$. Тоді маємо

$$f(A) \cap f(B) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\}) = f(\{x_1\}) = f(\{x_2\}) = \{y\} \neq f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset.$$

З отриманого протиріччя випливає наша імплікація.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

1. $\forall x \in X : x\mathcal{R}x$ (рефлексивність)

2. $\forall x, y \in X : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \rightarrow x\mathcal{R}z$ (транзитивність)

3. $\forall x, y \in X : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x) \rightarrow x = y$ (симетричність)

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

1. Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей.

2. Відношення “ділить” на множині, що складається з чисел.

3. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей.

4. Відношення “прямі на площині мають спільну точку” на множині, що складається з прямих на площині.

5. Відношення “мати схожість з певною фігурами” на множині, що складається з фігур.

6. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з фігур.

7. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з чисел.

8. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій.

9. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій, які мають початок та кінець.

10. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій, які мають початок та кінець та є непарні.

11. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій, які мають початок та кінець та є парні.

12. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій, які мають початок та кінець та є непарні та парні.

13. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій, які мають початок та кінець та є непарні та парні та є непарні.

14. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій, які мають початок та кінець та є непарні та парні та є непарні та парні.

15. Відношення “мати зображення в певній системі координат” на множині, що складається з функцій, які мають початок та кінець та є непарні та парні та є непарні та парні та є непарні.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

1. $\forall x \in X : x\mathcal{R}x$ (рефлексивність)

2. $\forall x, y \in X : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \rightarrow x\mathcal{R}z$ (транзитивність)

3. $\forall x, y \in X : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x) \rightarrow x = y$ (симетричність)

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

1. Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей.

2. Відношення “ділить” на множині, що складається з чисел.

3. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей.

4. Відношення “мати спільну точку” на множині, що складається з точок.

5. Відношення “мати спільний підмножину” на множині, що складається з підмножин.

6. Відношення “мати спільну компоненту” на множині, що складається з векторів.

7. Відношення “мати спільну компоненту” на множині, що складається з функцій.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

1. $\forall x \in X : x\mathcal{R}x$ (рефлексивність)

2. $\forall x, y \in X : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$ (транзитивність)

3. $\forall x, y \in X : (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$ (симетричність)

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

1. Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей.

2. Відношення “ділить” на множині, що складається з чисел.

3. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей.

4. Відношення “мати спільну точку” на множині, що складається з множин.

5. Відношення “мати спільний підмножину” на множині, що складається з множин.

6. Відношення “мати спільну точку перетину” на множині, що складається з множин.

7. Відношення “мати спільну площину проекції” на множині, що складається з множин.

8. Відношення “мати спільну площину проекції” на множині, що складається з множин.

9. Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним.

10. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним.

11. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ➊ рефлексивність: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ➋ симетричність: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ➌ транзитивність: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

• відношення “мати ту ж температуру” на множині людей;

• відношення “мати однакову вагу” на множині людей;

• відношення “мати однакову висоту” на множині людей;

• відношення “мати однакову кількість пальців” на множині людей;

• відношення “мати однакову кількість пальців на одній руці” на множині людей;

• відношення “мати однакову кількість пальців на двох руках” на множині людей;

• відношення “мати однакову кількість пальців на одній ногі” на множині людей;

• відношення “мати однакову кількість пальців на двох ногах” на множині людей;

• відношення “мати однакову кількість пальців на всіх п'яти конечностях” на множині людей;

• відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним.

Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” в рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① рефлексивність: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② симетричність: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ транзитивність: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

• відношення “мати однакову вагу” на множині людей;

• відношення “мати однакову висоту” на множині людей;

• відношення “мати однакову рідину” на множині речей;

• відношення “мати однакову температуру” на множині предметів;

• відношення “мати однакову кількість елементів” на множині множин.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” в рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей;
- відношення “ділить” на множині, що складається з чисел;
- відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей;
- відношення “прямі на площині мають спільну точку” на множині, що складається з прямих.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей;
- відношення “ділить” на множині, що складається з чисел;
- відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей;
- відношення “прямі на площині мають спільну точку” на множині, що складається з прямих.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- а) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- б) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- в) подібність фігур на площині (в просторі);
- г) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- а) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- б) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- в) подібність фігур на площині (в просторі);
- г) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- а) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- б) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- в) подібність фігур на площині (в просторі);
г) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
g) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Бінарним відношенням \mathcal{R} на множині X називається підмножина декартового добутку $X \times X$. Якщо $(x, y) \in \mathcal{R}$, то писатимемо $x\mathcal{R}y$.

Відношенням еквівалентності (еквівалентністю, еквіваленцією) на множині X називається бінарне відношення \mathcal{R} , для якого виконуються такі аксіоми:

- ① **рефлексивність**: $x\mathcal{R}x$, для кожного елемента $x \in X$;
- ② **симетричність**: якщо $x\mathcal{R}y$, то $y\mathcal{R}x$, для $x, y \in X$;
- ③ **транзитивність**: якщо $x\mathcal{R}y$ і $y\mathcal{R}z$, то $x\mathcal{R}z$, для $x, y, z \in X$.

Приклад 1.2.35

Відношеннями еквівалентності є:

- a) властивість навчатися в одній групі, властивість навчатися на одному курсі, властивість навчатися в одному навчальному закладі на множині усіх студентів;
- b) мати однакову рідну мову на множині усіх студентів ЛНУ;
- c) подібність фігур на площині (в просторі);
- d) різниця двох чисел є цілим числом, на множині дійсних чисел.

Відношення “мати можливість привітатися правою рукою” на множині, що складається з людей не є рефлексивним, але є симетричним і транзитивним. Відношення “ділить” є рефлексивним і транзитивним, але не є симетричним. Відношення “знайомий”, “друг” на множині, що складається з людей і відношення “прямі на площині мають спільну точку” є рефлексивними та симетричними, але не є транзитивними.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за відношенням еквівалентності \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності* елемента a за *відношенням еквівалентності* \sim . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Нехай \sim — відношення еквівалентності на множині X і $a \in X$. Позначимо

$$\tilde{a} = \{x \in X \mid a \sim x\}.$$

Назвемо підмножину \tilde{a} в X *класом суміжності елемента a за відношенням еквівалентності \sim* . Тоді, очевидно, що виконується рівність

$$X = \bigcup_{a \in X} \tilde{a}.$$

Теорема 1.2.36 є фундаментальною в математиці та її доведення випливає з означення відношення еквівалентності.

Теорема 1.2.36

Нехай X — множина і \sim — відношення еквівалентності на X . Тоді відношення \sim розбиває множину X на непорожні класи еквівалентностей, які або попарно не перетинаються, або збігаються.

Множина класів за відношенням еквівалентності \sim називається *фактор-множиною* за відношенням еквівалентності \sim , і позначається X/\sim . Отже, кожному елементові x з множини X можна поставити у відповідність клас, який містить елемент x , тобто \tilde{x} , а, отже, визначене відображення $\pi: X \rightarrow X/\sim$. Відображення π називається *природним*.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається *діагоналлю* множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається *антисиметричним*, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається *діагоналлю* множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається *антисиметричним*, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається *діагоналлю* множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається *антисиметричним*, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається *діагоналлю* множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається *антисиметричним*, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається *діагоналлю* множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається *антисиметричним*, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається **діагоналлю** множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається **антисиметричним**, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається **діагоналлю** множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається **антисиметричним**, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається *діагоналлю* множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається *антисиметричним*, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається **діагоналлю** множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається **антисиметричним**, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається **діагоналлю** множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається **антисиметричним**, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Лекція 3: Декартовий добуток множин, відношення, відображення

Композиція $\beta \circ \alpha$ двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ визначається так:

$$\beta \circ \alpha = \{(a, c) \in X \times Z \mid \text{існує елемент } b \in Y \text{ т., що } (a, b) \in \alpha \text{ і } (b, c) \in \beta\}.$$

Очевидно, що композиція двох відношень $\alpha \subseteq X \times Y$ і $\beta \subseteq Y \times Z$ є відношенням на $X \times Z$.

Вправа 1.2.13

Доведіть, що композиція

- (i) часткових відображень є частковим відображенням;
- (ii) відображень є відображенням;
- (iii) ін'єктивних відображень є ін'єктивним відображенням;
- (iv) сюр'єктивних відображень є сюр'єктивним відображенням;
- (v) біективних відображень є біективним відображенням.

Нехай X — довільна непорожня множина. Бінарне відношення

$$\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

називається **діагоналлю** множини X . Очевидно, що Δ_X — відношення еквівалентності на X .

Нагадаємо, що бінарне відношення \mathcal{R} на множині X називається **антисиметричним**, якщо з $x \mathcal{R} y$ і $y \mathcal{R} x$ випливає рівність $x = y$, для $x, y \in X$.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається *оберненим* до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається *оберненим* до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається *оберненим* до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Імплікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Якщо $\alpha \subseteq X \times Y$ то відношення $\alpha^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \alpha\}$ називається **оберненим** до відношення α .

Приклад 1.2.37

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y на X тоді і лише тоді, коли f — біективне відображення.

Розв'язок. Іmplікація (\Leftarrow) очевидна.

(\Rightarrow) Якщо $E(f) = D(f^{-1}) \neq Y$, то відношення $f \subseteq X \times Y$ не є сюр'єктивним відображенням, а отже відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ не є відображенням. Тому відображення $f: X \rightarrow Y$ має бути сюр'єктивним.

Припустимо, що відображення $f: X \rightarrow Y$ — не є ін'єктивним. Тоді існують різні елементи $x_1, x_2 \in X$ такі, що $f(x_1) = f(x_2) = y$. Отже $(y, x_1), (y, x_2) \in f^{-1}$, де f^{-1} — обернене відношення до відношенням f , а це суперечить тому, що відношення $f^{-1} \subseteq Y \times X$ є відображенням. З отриманого протиріччя випливає, що відображення $f: X \rightarrow Y$ ін'єктивне.

Зауважимо, що відношення діагоналі $\Delta_X \subseteq X \times X$ можна розглядати як відображення $\text{id}_X: X \rightarrow X$, визначене за формулою $\text{id}_X(x) = x$. Надалі, так визначене відображення $\text{id}_X: X \rightarrow X$ будемо називати **тотожним відображенням** множини X .

Вправа 1.2.14

Нехай $f: X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y в X тоді і лише тоді, коли

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_Y \quad \text{і} \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_X.$$

Зауважимо, що відношення діагоналі $\Delta_X \subseteq X \times X$ можна розглядати як відображення $\text{id}_X : X \rightarrow X$, визначене за формулою $\text{id}_X(x) = x$. Надалі, так визначене відображення $\text{id}_X : X \rightarrow X$ будемо називати **тотожним відображенням** множини X .

Вправа 1.2.14

Нехай $f : X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y в X тоді і лише тоді, коли

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_Y \quad \text{і} \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_X.$$

Зауважимо, що відношення діагоналі $\Delta_X \subseteq X \times X$ можна розглядати як відображення $\text{id}_X : X \rightarrow X$, визначене за формулою $\text{id}_X(x) = x$. Надалі, так визначене відображення $\text{id}_X : X \rightarrow X$ будемо називати **тотожним відображенням** множини X .

Вправа 1.2.14

Нехай $f : X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y в X тоді і лише тоді, коли

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_Y \quad \text{і} \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_X.$$

Зауважимо, що відношення діагоналі $\Delta_X \subseteq X \times X$ можна розглядати як відображення $\text{id}_X : X \rightarrow X$, визначене за формулою $\text{id}_X(x) = x$. Надалі, так визначене відображення $\text{id}_X : X \rightarrow X$ будемо називати **тотожним відображенням** множини X .

Вправа 1.2.14

Нехай $f : X \rightarrow Y$ — відображення. Доведіть, що обернене відношення f^{-1} до відношенням f є відображенням з Y в X тоді і лише тоді, коли

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_Y \quad \text{i} \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_X .$$

Дякую за увагу!!!

Дякую за увагу!!!