

Обчислювальна геометрія і алгебра

Олег Гутік



Лекція 14: Прямі

Наша перша мета в цій та подальших лекціях – охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто 0-вимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме “прямі” лінії — це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо.

Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку — це множина розв'язків лінійного рівняння.

Наша перша мета в цій та подальших лекціях – охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто 0-вимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме “прямі” лінії — це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо.

Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку — це множина розв'язків лінійного рівняння.

Наша перша мета в цій та подальших лекціях – охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто 0-вимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме “прямі” лінії — це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо.

Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку — це множина розв'язків лінійного рівняння.

Наша перша мета в цій та подальших лекціях – охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто 0-вимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме “прямі” лінії — це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо.

Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку — це множина розв'язків лінійного рівняння.

Наша перша мета в цій та подальших лекціях – охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто 0-вимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме “прямі” лінії — це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо.

Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку — це множина розв'язків лінійного рівняння.

Наша перша мета в цій та подальших лекціях – охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто 0-вимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме “прямі” лінії — це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо.

Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку — це множина розв’язків лінійного рівняння.

Наша перша мета в цій та подальших лекціях – охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто 0-вимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме “прямі” лінії — це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо.


Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку — це множина розв'язків лінійного рівняння.

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається *прямою* (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається *горизонтальною* (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається *вертикальною* (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається *кутовим коефіцієнтом прямої*.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається *прямою* (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається *горизонтальною* (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається *вертикальною* (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається *кутовим коефіцієнтом* прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається *прямою* (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається *горизонтальною* (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається *вертикальною* (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається *кутовим коефіцієнтом* прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається *прямою* (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається *горизонтальною* (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається *вертикальною* (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається *кутовим коефіцієнтом* прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається **прямою** (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається **горизонтальною** (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається **вертикальною** (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається **кутовим коефіцієнтом** прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається **прямою** (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається **горизонтальною** (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається **вертикальною** (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається **кутовим коефіцієнтом** прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається **прямою** (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається **горизонтальною** (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається **вертикальною** (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається **кутовим коефіцієнтом** прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається **прямою** (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається **горизонтальною** (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається **вертикальною** (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається **кутовим коефіцієнтом** прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається **прямою** (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається **горизонтальною** (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається **вертикальною** (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається **кутовим коефіцієнтом** прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається **прямою** (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається **горизонтальною** (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається **вертикальною** (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається **кутовим коефіцієнтом** прямої.



(a)



(b)




(c)

Означення 1.4.1 (рівняння прямої на площині)


Довільна множина L в \mathbb{R}^2 вигляду

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\}, \quad (1)$$


де a, b і c — довільні фіксовані дійсні константи (числа) такі, що a і b одночасно відмінні від нуля, називається **прямою** (див. рис. (a)). Якщо $a = 0$, то пряма називається **горизонтальною** (див. рис. (b)). Якщо $b = 0$, то пряма називається **вертикальною** (див. рис. (c)). Якщо $b \neq 0$, то число $-a/b$ називається **кутовим коефіцієнтом** прямої.



(a)



(b)



(c)

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$

Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму.

Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y -відрізком $(0, b)$ визначається рівнянням

$$y = mx + b. \quad (2)$$


Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт: пряма, що проходить через точку (x_1, y_1) з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (3)$$

Прямі

Рівняння прямої через дві точки: пряма, що проходить через дві різні точки (x_1, y_1) і (x_2, y_2) (див. рис.) визначається рівнянням

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1). \quad (4)$$




Зауважимо, що рівняння (2)–(4) можна застосувати лише для неvertикальних прямих, тобто ці рівняння визначають лише неvertикальні прямі.

Прямі

Рівняння прямої через дві точки: пряма, що проходить через дві різні точки (x_1, y_1) і (x_2, y_2) (див. рис.) визначається рівнянням

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1). \quad (4)$$




Зауважимо, що рівняння (2)–(4) можна застосувати лише для неvertикальних прямих, тобто ці рівняння визначають лише неvertикальні прямі.

Прямі

Рівняння прямої через дві точки: пряма, що проходить через дві різні точки (x_1, y_1) і (x_2, y_2) (див. рис.) визначається рівнянням

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1). \quad (4)$$




Зауважимо, що рівняння (2)–(4) можна застосувати лише для неvertикальних прямих, тобто ці рівняння визначають лише неvertикальні прямі.

Прямі

Рівняння прямої через дві точки: пряма, що проходить через дві різні точки (x_1, y_1) і (x_2, y_2) (див. рис.) визначається рівнянням

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1). \quad (4)$$




Зауважимо, що рівняння (2)–(4) можна застосувати лише для неvertикальних прямих, тобто ці рівняння визначають лише неvertикальні прями.

Прямі

Рівняння прямої через дві точки: пряма, що проходить через дві різні точки (x_1, y_1) і (x_2, y_2) (див. рис.) визначається рівнянням

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1). \quad (4)$$




Зауважимо, що рівняння (2)–(4) можна застосувати лише для неvertикальних прямих, тобто ці рівняння визначають лише неvertикальні прямі.

Прямі

Рівняння прямої через дві точки: пряма, що проходить через дві різні точки (x_1, y_1) і (x_2, y_2) (див. рис.) визначається рівнянням

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1). \quad (4)$$



Зауважимо, що рівняння (2)–(4) можна застосувати лише для неvertикальних прямих, тобто ці рівняння визначають лише неvertикальні прямі.

Прямі


Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду

$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).




Прямі

Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду
$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).



Прямі


Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду

$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).



Прямі


Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду

$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).




Прямі

Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду $\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$, (5)

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).



Прямі


Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду

$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).



Прямі


Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду

$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).




Прямі

Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду
$$\{\mathbf{p} + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де \mathbf{p} — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку \mathbf{p}* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).



Прямі


Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду

$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається **прямою, яка проходить через точку p** . Вектор \vec{v} називається **напрямним вектором прямої L** (див. випадок $n = 3$ на рис.).




Прямі

Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду
$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$
 де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).




Прямі

Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду
$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$

де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).




Прямі

Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння, і далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та напрямком.

Означення 1.4.2 (рівняння прямої через точку та напрямний вектор)

Довільна множина L в \mathbb{R}^n вигляду
$$\{p + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (5)$$
 де p — фіксована точка і \vec{v} — фіксований ненульовий вектор в \mathbb{R}^n , називається *прямою, яка проходить через точку p* . Вектор \vec{v} називається *напрямним вектором прямої L* (див. випадок $n = 3$ на рис.).



Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається *параметричним рівнянням* прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору *параметризації*. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{v}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору \vec{v} буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається *параметричним рівнянням* прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору *параметризації*. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається *параметричним рівнянням* прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору *параметризації*. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши покоординатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається *параметричним рівнянням* прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору *параметризації*. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$ на прямій L , тобто розклавши покоординатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається *параметричним рівнянням* прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору *параметризації*. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{v}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору \vec{v} буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору **параметризації**. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{v}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору \vec{v} буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору **параметризації**. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{v}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору \vec{v} буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$ на прямій L , тобто розклавши покоординатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору **параметризації**. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{v}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору \vec{v} буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору **параметризації**. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору **параметризації**. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши покоординатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору

параметризації. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t .

Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши покоординатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору **параметризації**. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t .

Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши по координатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору **параметризації**. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами куткових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$ на прямій L , тобто розклавши покоординатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{v}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається **параметричним рівнянням** прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору

параметризації. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{v}$ в момент часу t .

Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору \vec{v} буде визначати ту ж саму пряму.

Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Розглядаючи окремо компоненти типової точки $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ на прямій L , тобто розклавши покоординатно рівність векторів $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned}x_1 &= p_1 + tv_1, \\x_2 &= p_2 + tv_2, \\&\dots \quad \dots \\x_n &= p_n + tv_n, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}\tag{6}$$

яке називається *параметричним рівнянням* прямої.

У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення, засноване на рівнянні формули (1)

$$\{(x, y) \mid ax + by = c\},\tag{1}$$

є неявним означенням, тобто об'єкт був визначений рівнянням, тоді як означення за допомогою формули (5)

$$\{\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}} \mid t \in \mathbb{R}\},\tag{5}$$

є явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору *параметризації*. Ми можемо розглядати t як часовий параметр і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці $\mathbf{p} + t\vec{\mathbf{v}}$ в момент часу t . Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним. Будь-який ненульовий вектор кратний вектору $\vec{\mathbf{v}}$ буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах.

Приклад 1.4.3

Записати рівняння прямої, яка проходить через точки $p = (0, 2, 3)$ і $q = (-2, 1, -1)$.

Розв'язок. Вектор $\vec{pq} = (-2, -1, -4)$ є напрямним вектором прямої L , а отже параметричним рівнянням прямої L є

$$\begin{aligned}x &= -2t, \\y &= 2 - t, \\z &= 3 - 4t.\end{aligned}$$

Приклад 1.4.3

Записати рівняння прямої, яка проходить через точки $p = (0, 2, 3)$ і $q = (-2, 1, -1)$.

Розв'язок. Вектор $\vec{pq} = (-2, -1, -4)$ є напрямним вектором прямої L , а отже параметричним рівнянням прямої L є

$$\begin{aligned}x &= -2t, \\y &= 2 - t, \\z &= 3 - 4t.\end{aligned}$$

Приклад 1.4.3

Записати рівняння прямої, яка проходить через точки $\mathbf{p} = (0, 2, 3)$ і $\mathbf{q} = (-2, 1, -1)$.

Розв'язок. Вектор $\vec{pq} = (-2, -1, -4)$ є напрямним вектором прямої L , а отже параметричним рівнянням прямої L є

$$\begin{aligned}x &= -2t, \\y &= 2 - t, \\z &= 3 - 4t.\end{aligned}$$

Приклад 1.4.3

Записати рівняння прямої, яка проходить через точки $\mathbf{p} = (0, 2, 3)$ і $\mathbf{q} = (-2, 1, -1)$.

Розв'язок. Вектор $\vec{pq} = (-2, -1, -4)$ є напрямним вектором прямої L , а отже параметричним рівнянням прямої L є

$$\begin{aligned}x &= -2t, \\y &= 2 - t, \\z &= 3 - 4t.\end{aligned}$$

Приклад 1.4.3

Записати рівняння прямої, яка проходить через точки $\mathbf{p} = (0, 2, 3)$ і $\mathbf{q} = (-2, 1, -1)$.

Розв'язок. Вектор $\overrightarrow{pq} = (-2, -1, -4)$ є напрямним вектором прямої L , а отже параметричним рівнянням прямої L є

$$\begin{aligned}x &= -2t, \\y &= 2 - t, \\z &= 3 - 4t.\end{aligned}$$

Приклад 1.4.3

Записати рівняння прямої, яка проходить через точки $\mathbf{p} = (0, 2, 3)$ і $\mathbf{q} = (-2, 1, -1)$.

Розв'язок. Вектор $\overrightarrow{pq} = (-2, -1, -4)$ є напрямним вектором прямої L , а отже параметричним рівнянням прямої L є

$$\begin{aligned}x &= -2t, \\y &= 2 - t, \\z &= 3 - 4t.\end{aligned}$$

Приклад 1.4.3

Записати рівняння прямої, яка проходить через точки $\mathbf{p} = (0, 2, 3)$ і $\mathbf{q} = (-2, 1, -1)$.

Розв'язок. Вектор $\overrightarrow{pq} = (-2, -1, -4)$ є напрямним вектором прямої L , а отже параметричним рівнянням прямої L є

$$\begin{aligned}x &= -2t, \\y &= 2 - t, \\z &= 3 - 4t.\end{aligned}$$

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{l} L_1: \quad x = 1 - t \\ \quad \quad y = 2 + t \\ \quad \quad z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{l} L_2: \quad x = 2 + t \\ \quad \quad y = 1 - 2t \\ \quad \quad z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t .

Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримаємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t .

Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \quad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримаємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримаємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t .

Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t .

Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які "йдуть" по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же "час".

Приклад 1.4.4

Визначити чи перетинаються прямі L_1 і L_2 , що визначаються параметричними рівняннями:

$$\begin{array}{ll} L_1 : & x = 1 - t \\ & y = 2 + t \\ & z = -1 + t \end{array} \qquad \begin{array}{ll} L_2 : & x = 2 + t \\ & y = 1 - 2t \\ & z = -2 + t. \end{array}$$

Розв'язок. Ми маємо розв'язати рівняння

$$1 - t = 2 + s$$

$$2 + t = 1 - 2s$$

$$-1 + t = -2 + s$$

для змінних s і t . Додавши перше та друге рівняння отримуємо, що

$$3 = 3 - s,$$

а отже $s = 0$. Підставивши $s = 0$ в перше рівняння, отримуємо $t = -1$.

Оскільки два значення $t = -1$ і $s = 0$ змінних задовольняють третє рівняння, то підставивши значення параметра $t = -1$ в параметричне рівняння прямої L_1 маємо, що прямі L_1 і L_2 перетинаються в точці $(2, 1, -2)$. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра $s = 0$ підставимо в параметричне рівняння прямої L_2 замість параметра t . Поширена помилка при спробі розв'язати задачу, подібну до прикладу 1.4.3, — використовувати одну і ту ж змінну для s і t . Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які “йдуть” по прямих, потраплять до точки перетину цих прямих в той же “час”.

Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать (розташовані) між p і q* .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать (розташовані) між p і q* .



Означення 1.4.6


Точки називаються **колінеарними**, якщо вони лежать на одній прямій та **неколінеарними** в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається **відрізком від точки p до точки q** (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ **лежать (розташовані) між p і q** .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать (розташовані) між p і q* .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Означення 1.4.6


Точки називаються *колінеарними*, якщо вони лежать на одній прямій та *неколінеарними* в протилежному випадку.

Означення 1.4.7

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Множина

$$\{p + t\vec{pq} \mid t \in [0, 1]\} \quad (7)$$

називається *відрізком від точки p до точки q* (див. рис.), і надалі буде позначатися через $[p, q]$. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка $[p, q]$ *лежать* (розташовані) між p і q .



Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$. Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$. Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$. Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$.

Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\overrightarrow{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |t| \cdot |\overrightarrow{pq}| + |1 - t| \cdot |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкненого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\vec{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |t| \cdot |\vec{pq}| + |1 - t| \cdot |\vec{pq}| = |\vec{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Зауважимо, що $[p, q] = [q, p]$. Відрізок в основному узагальнює поняття замкнутого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення, але ці два поняття не зовсім однакові, у випадку $n = 1$. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка.

Твердження 1.4.8

Нехай $p, q \in \mathbb{R}^n$. Тоді

$$[p, q] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}|\}. \quad (8)$$

Доведення. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}|\}.$$

Для доведення включення $[p, q] \subseteq S$ зафіксуємо довільне точку $x \in [p, q]$. Тоді $x = p + t\vec{pq}$ для деякого дійсного числа t такого, що $0 \leq t \leq 1$.

Звідси випливає, що

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |t| \cdot |\vec{pq}| + |1 - t| \cdot |\vec{pq}| = |\vec{pq}|,$$

а отже $x \in S$.

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.

Оскільки

$$|\overrightarrow{px}| + |\overrightarrow{xq}| = |\overrightarrow{pq}| = |\overrightarrow{px} + \overrightarrow{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \overrightarrow{px} і \overrightarrow{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\overrightarrow{px} = t \cdot \overrightarrow{xq}$.

Тоді

$$|t| \cdot |\overrightarrow{xq}| + |\overrightarrow{xq}| = |t \cdot \overrightarrow{xq} + \overrightarrow{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$. Але рівність $\overrightarrow{px} = t \cdot \overrightarrow{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \overrightarrow{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.

Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.

Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Для доведення включення $S \subseteq [p, q]$ зафіксуємо довільне точку $x \in S$.
Оскільки

$$|\vec{px}| + |\vec{xq}| = |\vec{pq}| = |\vec{px} + \vec{xq}|,$$

то з нерівності трикутника випливає, що вектори \vec{px} і \vec{xq} є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$.
Тоді

$$|t| \cdot |\vec{xq}| + |\vec{xq}| = |t \cdot \vec{xq} + \vec{xq}|.$$

Іншими словами,

$$|t| + 1 = |t + 1|. \quad (9)$$

Легко бачити, що розв'язки рівняння (9) задовольняють нерівність $0 \leq t$.
Але рівність $\vec{px} = t \cdot \vec{xq}$ можна переписати так

$$x = p + \frac{1}{1+t} \cdot \vec{pq}.$$

З останньої рівності випливає, що $x \in [p, q]$, оскільки $0 \leq \frac{t}{1+t} \leq 1$. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\overrightarrow{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \overrightarrow{pq}$, а отже $c = |\overrightarrow{px}| = |s| \cdot |\overrightarrow{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \overrightarrow{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \overrightarrow{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\overrightarrow{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначається наступним чином $x = p + s \cdot \overrightarrow{pq}$, а отже $c = |\overrightarrow{px}| = |s| \cdot |\overrightarrow{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \overrightarrow{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \overrightarrow{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\overrightarrow{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \overrightarrow{pq}$, а отже $c = |\overrightarrow{px}| = |s| \cdot |\overrightarrow{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \overrightarrow{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \overrightarrow{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\overrightarrow{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \overrightarrow{pq}$, а отже $c = |\overrightarrow{px}| = |s| \cdot |\overrightarrow{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \overrightarrow{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \overrightarrow{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\overrightarrow{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \overrightarrow{pq}$, а отже $c = |\overrightarrow{px}| = |s| \cdot |\overrightarrow{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \overrightarrow{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \overrightarrow{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\overrightarrow{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \overrightarrow{pq}$, а отже $c = |\overrightarrow{px}| = |s| \cdot |\overrightarrow{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \overrightarrow{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \overrightarrow{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\vec{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \vec{pq}$, а отже $c = |\vec{px}| = |s| \cdot |\vec{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\vec{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\vec{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \vec{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \vec{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем.

Твердження 1.4.9

Нехай p — точка на прямій L . Якщо $c > 0$, то існує дві та лише дві точки x на L такі, що виконується рівність $|\overrightarrow{px}| = c$.

Доведення. Нехай q — точка на прямій L , відмінна від точки p . Тоді кожна точка x на прямій L має визначатися наступним чином $x = p + s \cdot \overrightarrow{pq}$, а отже $c = |\overrightarrow{px}| = |s| \cdot |\overrightarrow{pq}|$. Тоді лише $s = \pm t$ є розв'язками рівняння $|s| = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$, де $t = \frac{c}{|\overrightarrow{pq}|}$. Іншими словами,

$$x = p + t \cdot \overrightarrow{pq} \quad \text{або} \quad x = p - t \cdot \overrightarrow{pq},$$

що і завершує доведення нашого твердження. ■

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то промінь з точки p в напрямку \vec{v} (див. рис.), який позначається за формулою $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то промінь з точки p через точку q , який позначається через $[pq)$, визначається за формулою

$$[pq) = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то промінь з точки p в напрямку \vec{v} (див. рис.), який позначається $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то промінь з точки p через точку q , який позначається через $[pq)$, визначається за формулою

$$[pq) = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то *промінь з точки p в напрямку \vec{v}* (див. рис.), який позначається $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то *промінь з точки p через точку q* , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{\mathbf{v}} \neq \vec{\mathbf{0}}$, то *промінь з точки \mathbf{p} в напрямку $\vec{\mathbf{v}}$* (див. рис.), який позначається $\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}}) = \{\mathbf{p} + t \cdot \vec{\mathbf{v}} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$, то *промінь з точки \mathbf{p} через точку \mathbf{q}* , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{pq}}).$$



На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{\mathbf{v}} \neq \vec{\mathbf{0}}$, то **промінь з точки \mathbf{p} в напрямку $\vec{\mathbf{v}}$** (див. рис.), який позначається $\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}}) = \{\mathbf{p} + t \cdot \vec{\mathbf{v}} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$, то **промінь з точки \mathbf{p} через точку \mathbf{q}** , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(\mathbf{p}, \vec{pq}).$$



Прямі

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то **промінь з точки p в напрямку \vec{v}** (див. рис.), який позначається $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то **промінь з точки p через точку q** , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



Прямі

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то *промінь з точки p в напрямку \vec{v}* (див. рис.), який позначається $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то *промінь з точки p через точку q* , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



Прямі

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то *промінь з точки p в напрямку \vec{v}* (див. рис.), який позначається $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то *промінь з точки p через точку q* , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



Прямі

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то **промінь з точки p в напрямку \vec{v}** (див. рис.), який позначається $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то **промінь з точки p через точку q** , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



Прямі

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $p, q, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{v} \neq \vec{0}$, то **промінь з точки p в напрямку \vec{v}** (див. рис.), який позначається $\text{ray}(p, \vec{v})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(p, \vec{v}) = \{p + t \cdot \vec{v} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $p \neq q$, то **промінь з точки p через точку q** , який позначається через $[pq]$, визначається за формулою

$$[pq] = \text{ray}(p, \vec{pq}).$$



Прямі

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{\mathbf{v}} \neq \vec{\mathbf{0}}$, то *промінь з точки \mathbf{p} в напрямку $\vec{\mathbf{v}}$* (див. рис.), який позначається $\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}}) = \{\mathbf{p} + t \cdot \vec{\mathbf{v}} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$, то *промінь з точки \mathbf{p} через точку \mathbf{q}* , який позначається через $[\mathbf{p}\mathbf{q}]$, визначається за формулою

$$[\mathbf{p}\mathbf{q}] = \text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{p}\mathbf{q}}).$$



Прямі

На завершення означимо поняття променя.


Означення 1.4.10

Нехай $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^n$. Якщо $\vec{\mathbf{v}} \neq \vec{\mathbf{0}}$, то *промінь з точки \mathbf{p} в напрямку $\vec{\mathbf{v}}$* (див. рис.), який позначається $\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}})$, визначається за формулою

$$\text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{v}}) = \{\mathbf{p} + t \cdot \vec{\mathbf{v}} \mid 0 \leq t\}.$$

Якщо $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$, то *промінь з точки \mathbf{p} через точку \mathbf{q}* , який позначається через $[\mathbf{p}\mathbf{q}]$, визначається за формулою

$$[\mathbf{p}\mathbf{q}] = \text{ray}(\mathbf{p}, \vec{\mathbf{p}\mathbf{q}}).$$



Дякую за увагу!